



KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN THÔNG TIN THUỐC

BÌNH HÍT BỘT KHÔ SERETIDE ACCUHALER



Thành phần:

Salmeterol (50mcg/liều), Fluticasone propionat (500mcg/liều) **Seretide Accuhaler 50/500mcg**;

Salmeterol (50mcg/liều), Fluticasone propionat (250mcg/liều) **Seretide Accuhaler 50/250mcg**

Tá dược: Lactose monohydrate (Protein sữa)

Dạng bào chế: Bột hít phân liều

Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 accuhaler có 60 liều hít


Chỉ định:

Bệnh Hen (Bệnh tắc nghẽn đường dẫn khí có hồi phục)



- Các bệnh nhân vẫn có triệu chứng khi đang điều trị bằng corticosteroid dạng hít.
- Các bệnh nhân không được kiểm soát đầy đủ bằng corticosteroid dạng hít và thuốc chủ vận β_2 tác dụng ngắn dạng hít “khi cần”.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)



Chống chỉ định:

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc.

Điều trị chính tình trạng hen hoặc đợt cấp của hen phế quản, hoặc COPD khi cần điều trị tích cực.

Liều dùng và cách dùng:

Seretide Accuhaler  chỉ dùng để hít qua miệng.

Cần cho bệnh nhân biết rằng phải dùng **Seretide Accuhaler** thường xuyên để đạt được lợi ích tối ưu, thậm chí ngay cả khi không có triệu chứng

Hen (tắc nghẽn đường dẫn khí có phục hồi)

Liều đề nghị: Người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên:

Một liều hít 50/250mcg tới 50/500mcg Salmeterol/Fluticasone, 2 lần/ngày. (Tùy theo mức độ bệnh)

Lưu ý: Liều tối đa khuyến cáo cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi là 50/500mcg, 2 lần/ngày.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Liều đề nghị cho người lớn là một liều hít 50/250mcg tới 50/500mcg Salmeterol/Fluticasone propionat x 2 lần ngày.

Lưu ý: Ở liều điều trị 50/500mcg x2 lần /ngày Seretide được chứng minh giảm tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.

Nhóm bệnh nhân đặc biệt:

Không cần chỉnh liều cho bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân suy thận hoặc suy gan.

Thận trọng:

 Seretide Accuhaler không nên được bắt đầu ở những bệnh nhân đang trong giai đoạn tình trạng xấu đi nhanh chóng hoặc những đợt cấp của Hen hay COPD có nguy cơ đe dọa tính mạng.

 Seretide Accuhaler không phải là thuốc giảm triệu chứng cấp tính mà trong trường hợp cần dùng một thuốc giãn phế quản nhanh và ngắn (VD Sanbutamol) nên khuyến bệnh nhân luôn có sẵn thuốc cắt cơn bên mình,

 Seretide Accuhaler sử dụng mức liều cao hơn khuyến cáo hoặc sử dụng đồng thời với các thuốc LABA do có thể dẫn tới quá liều vì đã có những báo cáo liên quan đến tác động lên tim mạch và trường hợp tử vong ...



Sử dụng cho Phụ nữ có thai và cho con bú:

Cần nhắc nguy cơ và lợi ích đối với bào thai và trẻ nhỏ trước khi dùng Seretide Accuhaler

Tác dụng không mong muốn: Có thể rối loạn hành vi (run), rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh, đánh trống ngực, đau cơ, khàn giọng và nhiễm nấm candida miệng và họng, kích ứng họng, nói khó.

Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng dụng cụ Seretide Accuhaler



CÁCH SỬ DỤNG DỤNG CỤ HÍT BỘT KHÔ
Seretide® Accuhaler: 50/250mcg

1. Mở: đặt ngón cái ở rãnh và đẩy tối đa về phía xa
2. Đẩy cần tối đa cho tới khi nghe tiếng tách
3. Cầm accuhaler xa miệng và thở ra hết mức
4. Hít vào đều và sâu
5. Nín thở 10 giây
4. Đóng accuhaler

Lưu ý: súc miệng kỹ ngay sau khi xịt/hít thuốc. Ngậm một ngụm nước, ngửa cổ cho tới khi thấy trần nhà, khò kỹ cổ họng, nhổ ra. Lặp lại 3 lần.

Bước 1: Mở nắp đặt ngón tay cái ở rãnh và đẩy tối đa về phía xa.

Bước 2: Giữ dụng cụ Accuhaler trong tay sao cho đầu ngậm về phía bạn. Đẩy cần tối đa về phía xa khỏi người bạn, cho đến khi nghe tiếng “tách” (một liều thuốc đã được nạp vào để sẵn sàng sử dụng).

Bước 3: Cầm accuhaler xa miệng và thở ra hết sức.

Bước 4: Đặt đầu ngậm của dụng lên môi, hít vào đều và sâu qua đường miệng và không hít bằng mũi.

Bước 5: Nhấc dụng cụ accuhaler ra khỏi miệng và nhịn thở khoảng 10 giây và sau đó thở ra từ từ.

Bước 6: Đóng nắp bình: Gạt cần về phía bạn và có tiếng “ tách”, lau đầu ngậm bằng khăn giấy khô lưu ý ko lau khăn, giấy ướt.

Lưu ý: Súc miệng kỹ ngay sau khi hít với nước rồi nhổ ra phòng nhiễm nấm miệng và khàn giọng.

Bảo quản: Bảo quản dưới 30°C, không để đóng băng, tránh ánh sáng.

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH PHÚ THỌ

 Địa chỉ: Số 402, khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 Hotline: 0964 68 1414; 1800 888 959

 Website: www.benhvienphoitinhphutho.com.vn

Biên soạn bởi: DCKI. Nguyễn Thị Mai Huyền

Hiệu đính: PGS.TS. Nguyễn Thành Hải, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội

Tài liệu tham khảo:

Tờ thông tin sản phẩm Acuhaler của Nhà sản xuất GlaxoSmithKline LLC, 1011 North Arendell, Avenue, Zebulon, North Carolina 27597, Mỹ